

- 7) nařizuje nejpozději do 26. 5. 2006 nahlásit KVS (tel.+záznamník 541211374, faxem 547 212 451 nebo elektronicky na adresu kvsb@svscr.cz) aktuální stavý chovaných ptáků s uvedením počtu, druhu a kategorie, a hlásit veškeré změny těchto stavů.
- D. Chovatelům psů se nařizuje při pohybu psů mimo obydlí držet psy na vodítku k zabránění přímého kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky.
- E. Zakazují se veřejná vystoupení, trhy a svody ptáků a pořádání soutěží poštovních holubů.
- F. Zakazuje se vypouštění pernaté zvěře do honitby.
- G. Zakazuje se lov pernaté zvěře a odstrel volně žijících ptáků.
- H. Osobám, které jako podnikatelé zacházejí se živočišnými produkty se zakazuje odesílání čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků původem z ptáků a z volně žijící pernaté zvěře z tohoto pásmu.

KVS může na základě žádosti a v souladu s RK 2006/115/ES povolit odchylky z některých výše nařízených opatření.

Čl. 4 Opatření na celém území Jihomoravského kraje

- 1) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonností zkoušky a chovatelské soutěže.
- 2) Pozastavuje se platnost vydaných veterinární podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných KVS pro svody a zakazuje se účast drůbeže a ostatních ptáků z Jihomoravského kraje na svodech v zahraničí a ostatním území ČR.
- 3) Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů na území Jihomoravského kraje a účast poštovních holubů chovatelů z Jihomoravského kraje na soutěžích.

Čl. 5 Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjemem krmina, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 – 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmina, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenze (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenze (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení